




## SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT CONFÉDÉRATION SUISSE SWISS CONFEDERATION



### Bescheinigung


Die beiliegenden Akten stimmen überein mit den ursprünglichen Unterlagen der auf den nächsten Seiten bezeichneten, beim unterzeichneten Amt als Anmeldeamt im Sinne von Art. 10 des Vertrages über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) eingegangenen Patentanmeldung.

#### **Attestation**

Les documents ci-joints sont conformes aux pièces originales relative à la demande de brevet spécifiée aux pages suivantes, déposées auprès de l'Office soussigné, en tant qu'Office récepteur au sens de l'article 10 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

#### Confirmation

It is hereby confirmed that the attached documents are corresponding with the original pages of the international application, as identified on the following pages, filed under Article 10 of the Patent Cooperation Treaty (PCT) at the receiving office named below.



PRIORITY
DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

lelitu

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Swiss Federal Intellectual Property Institute

Patentverfahren Administration des brevets Patent Administration

Rolf Hofstetter

# Anmeldeamtsexemplar

# **PCT**

#### **ANTRAG**

Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird.

<b>—</b> `	Vom	Anmeldeamt	auszufüllen	_
------------	-----	------------	-------------	---

PCT/CH 0 3 / 0 0 8 5 3

3 1. Dez. 2003 ( 3 1. 12. 03 )

Internationales Anmeldedatum

RO/CH - Internationale Anmeldung PCT

Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht) (max. 12 Zeichen) P1339PCT

	- P1	339PC1
Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG	*	
Neue kristalline Formen von Entacapone und der	en Herstellung	
Feld Nr. II ANMELDER Diese Person ist gl	leichzeitig Erfinder	
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname: bei juristischen Person Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des St	aats anzugeben. Der in	Telefonnr.:
diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitze Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angeg	es oaer wonnsitzes des geben ist.)	Telefaxnr.:
Cilag AG		
Hochstrasse 201 CH-8205 Schaffhaussen		Fernschreibnr.:
Schweiz		Registrierungsnr. des Anmelders beim Amt:
30,111,312		-
Staatsangehörigkeit (Staat): CH	Sitz oder Wohnsitz (St CH	aat):
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- für folgende Staaten: alle Bestim- mungsstaaten alle Bestimmungssta	aten mit Ausnahme ten von Amerika	nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld angegebenen Staaten
Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITE	RE) ERFINDER	
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Person Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des S.	taats anzugeben. Der in	Diese Person ist:
diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitz Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes ange,	es oder Wohnsitzes des	nur Anmelder
BADER, Thomas	-	Anmelder und Erfinder
Buchzelgstrasse 78		nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden
CH-8053 Zürich		Angaben nicht nötig.) Registrierungsnr. des Anmelders beim Amt:
Schweiz		200 Strot angom: des 7 americans com com
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (St.	aat):
DE		nur die Vereinigten die im Zusatzfeld
		Staaten von Amerika angegebenen Staaten
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einen	n Fortsetzungsblatt ange	geben.
Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRET	TER; ODER ZUSTEL	LANSCHRIFT
Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um fi vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigens	chaft zu handeln als:	Anwalt gemeinsamer Vertreter
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Perso Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postle Staats anzugeben.)	nen vollständige amtliche itzahl und der Name des	Telefonnr.: +41 61 307 90 30
BRAUN, André		Telefaxnr.:
Braun & Partner		+41 61 307 90 39 Fernschreibnr.:
Reusstrasse 22		remsementu.
CH-4054 Basel		Registrierungsnr. des Anwalts beim Amt:
Schweiz		
Zustellanschrift: Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn ke	ein Anwalt oder gemeins	samer Vertreter bestellt ist und statt dessen im
obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.		

# PCT/CH 03 / 00853

Blatt Nr. ...2...

Fortsetzung von Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER						
Wird keines der folgenden Felder benutzt, so sollte dieses Blatt dem Antrag nicht beigefügt werden.						
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Person Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Sidiesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzenmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes ange FUREGATI, Markus Wehntalerstrasse 472 CH-8046 Zürich Schweiz  Staatsangehörigkeit (Staat): CH  Diese Person ist Anmelder alle Bestimmungsstaten alle Bestimmungsstaten alle Bestimmungsstaten Staaten:	nur Anmelder  eigeben ist.)  Anmelder und Erfinder  nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)  Registrierungsnr. des Anmelders beim Amt:  Sitz oder Wohnsitz (Staat):  CH  auten mit Ausnahme und und Erfinder  nur Anmelder und Erfinder  nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)  Registrierungsnr. des Anmelders beim Amt:					
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Persc Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sit Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes ang	Staats anzugeben. Der in zes oder Wohnsitzes des egeben ist.)  Anmelder und Erfinder  nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)  Registrierungsnr. des Anmelders beim Amt:					
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Staat):					
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- alle Bestimmungsst für folgende Staaten: alle Bestimmungsstaaten der Vereinigten Sta	taaten mit Ausnahme . nur die Vereinigten die im Zusatzfeld angegebenen Staaten von Amerika angegebenen Staaten					
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Perst Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Si Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes ang	Staats anzugeben. Der in nur Anmelder					
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Staat):					
Diese Person ist Anmelder alle Bestimmungsstaaten alle Bestimmungsstaaten der Vereinigten Sta	staaten mit Ausnahme nur die Vereinigten die im Zusatzfeld angegebenen Staaten von Amerika angegebenen Staaten					
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Pers Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des S Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes an	itzes oder Wohnsitzes des nur Anmelder					
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Staat):					
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- gfür folgende Staaten: alle Bestimmungsstaaten der Vereinigten S	sstaaten mit Ausnahme nur die Vereinigten die im Zusatzfeld taaten von Amerika Staaten von Amerika angegebenen Staate					
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf ein	nem zusätzlichen Fortsetzungsblatt angegeben.					

Fel	d I	Nr.	V BESTIMMUNG VON STAATE	en .	Bitte die entsprechenden Kästchen ankreuzen,	we	nigste	ns ein Kästchen muß angekreuzt werden.
Die	fc	olge	enden Bestimmungen nach Regel 4.9 A	Absatz	a werden hiermit vorgenommen:			
Re	gi	ona	ales Patent					
			ARIPO-Patent: GH Ghana, GM SL Sierra Leone, SZ Swasiland, TZ Ve Staat, der Vertragsstaat des Harare-Pi gewünschtwird, bitte aufder gepunktete	reinig rotoko n <i>Lini</i> e	te Republik Tansania, UG Uganda, ZM Ils und des PCT ist (falls eine andere i e angeben)	A Sa Schi	mbi: uzrec	a, ZW Simbabwe und jeder weitere chtsart oder ein sonstiges Verfahren
X	E	A	Eurasisches Patent: AM Armenien Moldau, RU Russische Föderation, ' Eurasischen Patentübereinkommens u	<b>IJ</b> Ta and de	dschikistan, TM Turkmenistan und s PCT ist	jede	er we	eitere Staat, der Vertragsstaat des
K			Europäisches Patent: AT Österrei CZ Tschechische Republik, DE De GB Vereinigtes Königreich, GR GNL Niederlande, PT Portugal, RO Ruder Vertragsstaat des Europäischen F	utschl rieche mänie atenti	land, DK Dänemark, EE Estland, E enland, HU Ungarn, IE Irland, IT en, SE Schweden, SI Slowenien, SK S lbereinkommens und des PCT ist	S S Ita low	pani ilien, akei,	en, FI Finnland, FR Frankreich, LU Luxemburg, MC Monaco, TR Türkei und jeder weitere Staat,
•			OAPI-Patent: BF Burkina Faso, BJ GA Gabun, GN Guinea, GQ Äquato TD Tschad, TG Togo und jeder weite oder ein sonstiges Verfahren gewünsch	rialgu ere Sta et wird	inea, GW Guinea-Bissau, ML Mali, aat, der Vertragsstaat der OAPI und de bitte auf der gepunkteten Linie angebe	MR es P en)	Ma CT is	uretanien, NE Niger, SN Senegal, st (falls eine andere Schutzrechtsart
Na	ti	on	ales Patent (falls eine andere Schutzrec	htsart e	oder ein sonstiges Verfahren gewünscht w	ird,	bitte	auf der gepunkteten Linie angeben): •
			Vereinigte Arabische Emirate	HR	Kroatien	X.	OM	Oman
X	A	G	Antigua und Barbuda Albanien	I HU	Ungarn	1221 1221	PG	Philippinen
	Λ	M	Armenien	ar B	Israel	X	PL	Polen
K	A	Т	Österreich+ Gebrauchsmuster	NI D	Indien	K	PT	Portugal
K	A	U	Australien	ZI IS	Island	K	RO	Rumänien
K	A	Z	Aserbaidschan	JP	Japan	K	RU	
			Bosnien-Herzegovina		Kenia	<b>1</b>	SC.	Seychellen
	В	8B	Barbados Bulgarien	N KP	Demokratische Volksrenublik	K	SD	Sudan
			Brasilien		Korea	K	SE	Schweden
7	п	٤V	Relamis	<b>C</b> KR	Republik Korea	X	SG	Singapur
X	B	3Z	Belize	KZ KZ	Kasachstan	K	SK	Slowakei + Gebrauchsmuster.
K	•	CA	Kanada	Z LC	Saint Lucia	X	SL	Sierra Leone
					Sri Lanka			Arabische Republik Syrien Tadschikistan
K		CN	China	ZI LK	Liberia			
		CO	Costa Rica	EL LZ	Lesouno			Tunesien
K	6	11	Kuba	K LU	Luxemburg			Türkei
K	(		Tschechische Republik + Geb.mus	K LV	Lettland		TT	Trinidad und Tobago
	Ιr	)E	Deutschland + Gebrauchsmuster	$\mathbf{Z}$ $\mathbf{M}$	Marokko			
K	r	DΚ	Dänemark + Gebrauchsmuster	ZI MI	D Republik Moldau	X	TZ	Vereinigte Republik Tansania
K	lI	DM	l Dominica Algerien	<b>27</b>			UA	Ukraine
X	I	DZ	Algerien Ecuador	SU 1/VIV	G Madagaskar	K	US	Vereinigte Staaten von Amerika
	1 1	F 17	Estland + Gebrauchsmuster		Republik Mazedonien			
K	ĺ	ES	Spanien Finnland+ Gebrauchsmuster	KI MI	N Mongolei	K	UZ	Usbekistan
K	1 r	FI	Finnland+ Gebrauchsmuster	M M	w Malawi	X	VC	St. Vincent und die Grenadinen
					X Mexiko	X	VN	Vietnam
K	] (	GD	Grenada Georgien	KI M	Z Mosambik		1 7 A	Südafrika
5	1 0	GE	Georgien	KI NO	Norwegen			I Sambia
•			1 Gambia	K NZ	Z Neuseeland			
1	Kästchen für die Bestimmung von Staaten, die dem PCT nach der Veröffentlichung dieses Formblatts beigetreten sind.							
K			en für die Bestimmung von Staaten, die GÄgypten					
F		<u>. ፦ የ</u>	rung bzgl. vorsorglicher Bestimmur	بع لحم 19en:	Zusätzlich zu den ohen genannten	Be	tim	nungen nimmt der Anmelder nach
ΙR	ee	rel a	4.9 Absatz b auch alle anderen nach	dem F	CT zulässigen Bestimmungen vor n	nit /	Ausn	ahme der im Zusatzfeld genannten
l p	-	tim	nmungen, die von dieser Erklärung ausg halt einer Bestätigung stehen und jede	enom	men sind. Der Anmelder erklärt, daß	dies	e zu	sätzlichen Bestimmungen unter dem
l b	esi	täti	gt wurde, nach Ablauf dieser Frist als	vom A	Anmelder zurückgenommen gilt. (Die	Be	stäti,	gung (einschließlich der Gebühren)
l n	1 <i>u</i> /	ß be	eim Anmeldeamt innerhalb der Frist vo	n 15 l	Monaten eingehen.)			

Blatt Nr. ...4...

Feld Nr. VI PRIORITÄTSANSPRUCH								
Die Priorität der folgenden früheren Anmeldung(en) wird hiermit in Anspruch genommen:								
Anmeldedatum der früheren Anmeldung		Aktenzeichen	I	Ist die frühere Anmeldung eine:				
(Tag/Monat/Jahr)	der Truneren Aimeldung	nationale Anmeldung: Staat oder Mitglied der WTO	regionale Anmeldung:* regionales Amt	internationale Anmeldung: Anmeldeamt				
Zeile (1	)							
Zeile (2	2)							
Zeile (3	3)							
Zeile (4	1)							
Zeile (	5)							
□ v	Veitere Prioritätsa	ansprüche sind im Zusatzfo	eld angegeben.					
interna	itionalen Büro zu	ersucht, eine beglaubigte i übermitteln (nur falls die nmeldung Anmeldeamt ist)	Abschrift der oben bezeichne frühere Anmeldung(en) bei dem :	eten früheren Anmeldung Amt eingereicht worden is	(en) zu erstellen und dem st (sind), das für die Zwecke			
•		Zeile (1) Zeile (2)		eile (4) Zeile (5)	weitere, siehe Zusatzfeld			
* Falls Parise die frü	s es sich bei der fr r Verbandsüberei ihere Anmeldung	üheren Anmeldung um eine inkunft zum Schutz des gewe eingereicht wurde:	ARIPO-Anmeldung handelt, geb erblichen Eigentums oder Mitglie	ven Sie mindestens einen St d der Welthandelsorganisc	aat an, der Mitgliedstaat der ation ist und für den oder das			
Feld I	Nr. VII INTE	ERNATIONALE RECHI	ERCHENBEHÖRDE					
Wahl der inte	der internationa ernationalen Reche	nlen Recherchenbehörde erche zuständig sind, geben S	(ISA) (falls zwei oder mehr als zw ie die von Ihnen gewählte Behörde	vei internationale Recherche an; der Zweibuchstaben-Ce	nbehörden für die Ausführung ode kann benutzt werden):			
Recher	g auf Nutzung ( che bei der intern (Tag/Monat/Jah	nationalen Recherchenbehö	heren Recherche; Bezugnah irde beantragt oder von ihr durch Aktenzeichen	hgeführt worden ist):	echerche (falls eine frühere regionales Amt)			
Feld l	Nr. VIII ERK	LÄRUNGEN						
			nden Erklärungen <i>(Kreuzen Sie</i> für jede Erklärung deren Anzah		Anzahl der Erklärungen			
	Feld Nr. VIII (i	) Erklärung hinsich	tlich der Identität des Erfinders	3	:			
	Feld Nr. VIII (i		tlich der Berechtigung des Ann nmeldedatums, ein Patent zu be					
	Feld Nr. VIII (iii) Erklärung hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, zum Zeitpunkt des internationalen Anmeldedatums, die Priorität einer früheren Anmeldung zu beanspruchen :							
	Feld Nr. VIII (i	iv) Erfindererklärung Staaten von Ame	g (nur im Hinblick auf die Besti rika)	immung der Vereinigten	:			
	Feld Nr. VIII (	v) Erklärung hinsich von der Neuheits	ntlich unschädlicher Offenbarur schädlichkeit	ngen oder Ausnahmen	:			

Feld Nr. IX KONTROLLISTE; EINREICHUNGSSPRACHE							
Diese internationale Anmeldung enthält:	Dieser internationalen Anmeldung liegen die folgenden	Anzahl					
(a) auf Papier, die folgende Anzahl Blätter:	Unterlagen bei (kreuzen Sie die entsprechenden Kästchen an und geben Sie in der rechten Spalte jeweils die Anzahl						
Antrag (inklusive Erklärungsblätter) : 5	der beiliegenden Exemplare an)	1					
Beschreibung (ohne Sequenzprotokolle und/oder	1. X Blatt für die Gebührenberechnung 2. X Original einer gesonderten Vollmacht	: 3					
Sequenzprotokolle und/oder diesbezügliche Tabellen) : 13	3.  Original einer allgemeinen Vollmacht	; "					
Ansprüche : 4	4. T Kopie der allgemeinen Vollmacht: Aktenzeichen (falls	.					
Zusammenfassung : 1	vorhanden):	:					
Zeichnungen :	<ol> <li>Begründung für das Fehlen einer Unterschrift</li> <li>Prioritätsbeleg(e), in Feld Nr. VI durch folgende</li> </ol>	:					
Teilanzahl : 23	Zeilennummer(n) gekennzeichnet:	:					
Sequenzprotokolle :	7. ☐ Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache:						
diesbezügliche Tabellen :	8. Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen oder anderem biologischen Material						
(für beide, Anzahl der Blätter, soweit auf Papier eingereicht		:					
soweit auf Papier eingereicht wird, unabhängig davon, ob zusätzlich auch in computer-	9. Sequenzprotokolle in computerlesbarer Form (Art und Anzahl der Datenträger)						
lesbarer Form eingereicht wird;	(i) T Kopie ausschließlich für die Zwecke der internationalen						
siehe unter (c)) Gesamtanzahl : 23	Recherche nach Regel 13 <i>ter</i> (und nicht als Teil der internationalen Anmeldung)	:					
Gesamtanzahl : 23	(ii) (nur falls Felder (b)(i) oder (c)(i) in der linken Spalte angekreuzt wurden) zusätzliche Kopien einschließlich, soweit zutreffend, einer Kopie für die Zwecke der						
(b) ausschließlich in computerlesbarer	soweit zutreffend, einer Kopie für die Zwecke der internationalen Recherche nach Regel 13 <i>ter</i>	_					
Form (Abschnitt 801(a)(i))		.					
(i) ☐ Sequenzprotokolle (ii) ☐ diesbezügliche Tabellen	(iii) ☐ zusammen mit entsprechender Erklärung, daß die Kopie(n) mit dem in der linken Spalte aufgeführten Sequenzprotokollen identisch ist (sind)						
(ii) ☐ diesbezügliche Tabellen (c) ☐ auch in computerlesbarer Form	10. Tabellen in computerlesbarer Form im Zusammenhang mit Sequenzprotokollen (Art und Anzahl der Datenträger)						
(Abschnitt 801(a)(ii))							
(i) Sequenzprotokolle	(i) Kopie ausschließlich für die Zwecke der internationalen Recherche nach Abschnitt 802(b-quater) (und nicht als						
(ii) diesbezügliche Tabellen	Teil der internationalen Anmeldung)  (ii) [ (nur falls Felder (b)(ii) oder (c)(ii) in der linken Spalte	:					
Art und Anzahl der Datenträger (Diskette, CD- ROM, CD-R oder sonstige) auf denen sich befinden	angekreuzt wurden) zusätzliche Konien einschließlich.						
(i) Sequenzprotokolle:	soweit zutreffend, einer Kopie für die Zwecke der internationalen Recherche nach Abschnitt 802(b- <i>quater</i> )	:					
(ii) diesbezügliche Tabellen:	(iii) zusammen mit entsprechender Erklärung, daß die Konie(n) mit dem in der linken Spalte aufgeführten						
(zusätzliche eingereichte Kopien unter Punkt 9(ii) und/oder 10(ii) in der rechten Spalte angeben)	Kopie(n) mit dem in der linken Spalte aufgeführten Tabellen identisch ist (sind)	: 1					
Abbildung der Zeichnungen, die	11. Sonstige (einzeln aufführen): Untervollmacht	- '					
mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden soll (Nr.):	internationale Anmeldung Deutsch eingereicht wird:						
Feld Nr. X UNTERSCHRIFT DES ANMELD	ERS. DES ANWALTS ODER DES GEMEINSAMEN VERTRETE	ERS					
Der Name jeder unterzeichnenden Person ist neben der Untergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet.	erschrift zu wiederholen, und es ist anzugeben, sofern sich dies nicht eindeutig aus	dem Antrag					
ergiot, in wetcher Ligenschaft are 1 erson unterzeiennet.							
A / A	•						
André Braun	30. Dezember 2003 / bc						
	Vom Anmeldeamt auszufüllen						
Datum des tatsächlichen Eingangs dieser		hnungen:					
internationalen Anmeldung:	3 1. Dez. 2003 ( 3 1. 12. 03 )	ngagangani					
3. Geändertes Eingangsdatum aufgrund nachträglich		ngegangen:					
<ol> <li>Geändertes Eingangsdatum aufgrund nachträglich fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeich Vervollständigung dieser internationalen Anmelo</li> </ol>	nungen zur						
vervonstandigung dieser internationalen Annierdung.							
4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten Richtigstellungen nach Artikel 11(2) PCT:							
Kichtigstehungen nach Artikel 11(2) FC1.							
5. Internationale Recherchenbehörde							
(falls zwei oder mehr zuständig sind): ISA / Dis zur Zahlung der Recherchengebuhr aufgeschoben							
Von	n Internationalen Büro auszufüllen						
Datum des Eingangs des Aktenexemplars							
beim Internationalen Büro:							

- 1 -

## Neue kristalline Formen von Entacapone und deren Herstellung

5

20

25

Entacapone ist die Kurzbezeichnung für (E)-N,N-Diethyl-2cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)acrylamid. Bei
Entacapone handelt es sich um einen peripheren und

10 selektiven Catechol-O-Methyltransferase (COMT)-Inhibitor,
der in Kombination mit Levodopa (L-Dopa) und einem
Decarboxylasehemmer (z. B. Carbidopa) zur Behandlung des
Parkinson-Syndroms eingesetzt wird. Entacapone erhöht die
Bioverfügbarkeit von L-Dopa und verlängert auch dessen

15 Wirkungsdauer. Dieser Effekt erlaubt eine Reduktion der zu
verabreichenden Menge von L-Dopa von 10-30%, indem das
Dosierungsintervall verlängert und/oder die Einzeldosis von
L-Dopa verringert wird. Das Präparat ist unter den Namen
COMTAN® bzw. COMTESS® im Handel.

Beschrieben und per se beansprucht wird die Substanz "N,N-Diethyl-2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)acrylamid" in dem US-Patent 5,446,194 sowie in zur gleichen Familie gehörenden Patenten in europäischen Ländern, wie DE 37 40 383, GB 2 200 109 und CH 685 426; die entsprechenden Patentschriften enthalten jedoch keine genaueren Angaben über die Konfiguration bzw. über die

Isomerenzusammensetzung dieser Verbindung.

Die Synthese von N.N-Diethyl-2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5nitrophenyl)acrylamid erfolgt gemäss den oben erwähnten Patentschriften durch eine Knoevenagel-Kondensation von 3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehyd, der durch Demethylierung von 5-Nitrovanillin mit HBr erhalten wird, und N.N-Diethyl-2-cyanoacetamid. Diese Knoevenagel-Kondensation wird in Gegenwart einer katalytischen Menge Piperidin/Essigsäure - 2 -

als Katalysator durchgeführt. Allerdings enthalten diese Patentschriften, wie bereits erwähnt, weder Angaben über die Zusammensetzung des Produktgemisches (E-/Z-Isomere) noch sind darin Methoden zur Trennung dieses Gemisches und zur Reinigung seiner Komponenten beschrieben (Ausbeute: 73%). Erst in den Patentschriften EP 0 426 468 und US 5135950 (siehe unten) ist die Zusammensetzung des aus der Knoevenagel-Kondensation erhaltenen Rohproduktes (70-80% E-Isomer und 30-20% Z-Isomer) angegeben.

10

15

20

25

30

35

In den soeben erwähnten Patenten EP 0 426 468 und US 5,135,950 ist die polymorphe Form A von Entacapone, d.h. (E) -N, N-Diethyl-2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5nitrophenyl)acrylamid, sowie deren Herstellung geschützt. Neben der polymorphen Form A ist in den entsprechenden Patentschriften auch eine weitere polymorphe Form B erwähnt, allerdings sind keine Daten für diese polymorphe Form B aufgeführt. Die Ansprüche betreffen lediglich die kristallographisch im wesentlichen reine polymorphe Form A sowie deren Herstellung. Gemäss den Angaben in den entsprechenden Patentschriften bedeutet "kristallographisch im wesentlichen reine polymorphe Form A von Entacapone", dass höchstens 3% und vorzugsweise höchstens 2% einer anderen polymorphen Form oder des Z-Isomeren enthalten ist. Zur Herstellung von Entacapone in der kristallographisch im wesentlichen reinen polymorphen Form A wird gemäss diesen Patentschriften das aus der Knoevenagel-Kondensation erhaltene Rohprodukt (70-80% E-Isomer und 30-20% Z-Isomer) in Essigsäure gelöst, mit katalytischen Mengen HBr oder HCl versetzt und anschliessend auf 90°C erhitzt. Durch langsames Abkühlen kristallisiert das Produkt in der gewünschten polymorphen Form A aus (Ausbeute: 80%).

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wurde nun festgestellt, dass Entacapone in zwei neue polymorphe Formen gebracht werden kann, welche nachstehend als "Form C" und "Form D" bezeichnet werden.

- 3 -

Form C von Entacapone ist charakterisiert durch die folgenden XRD-Daten:

Tabelle 1. XRD-Daten der polymorphen Form C von Entacapone

Winkel 2 theta(°)	Gitterabstand d (Å)	rel. Intensität I/Imax(%)
5.61 .	15.77	100
11.43	7.78	1
14.75	6.06	2
17.23	5.21	5
18.81	4.78	2
20.89	4.32	1
23.13	3.92	17
25.23	3.62	2
26.87	3.41	3
29.03	3.18	1
32.17	2.90	2

Anmerkung: Aufgrund von Textureffekten können die Intensitäten bekanntermassen variieren

Form D von Entacapone ist charakterisiert durch die folgenden XRD-Daten:

Tabelle 2. XRD-Daten der polymorphen Form D von Entacapone

Winkel 2 theta(°)	Gitterabstand d (Å)	rel. Intensität I/Imax(%)
6.84	12.95	99
11.84	7.51	6
12.12	7.34	7
13.52	6.59	49
14.8	6.04	23
15.56	5.75	40 ·
16.54	5.42	31
16.9	5.30	22
17.98	4.99	37
18.84	4.77	12
19.06	4.72	13
20.72	4.36	. 18
21.44	4.22	28
. 22.24	4.07	12
23.4	3.88	22
24	3.79	39
24.62	3.70	76
25.34	3.60	51
26.5	3.46	65
27.44	3.35	100
28.08	3.28	51
29.24	3.16	15
29.98	3.09	17

Anmerkung: Aufgrund von Textureffekten können die Intensitäten bekanntermassen variieren

10

5

Die erfindungsgemässen kristalline Formen C und D von Entacapone eignen sich zur Anwendung als therapeutische

- 4 -

Wirkstoffe. Sie können nach allgemein üblichen Verfahren unter Verwendung gebräuchlicher Hilfsstoffe zu Arzneimitteln verarbeitet werden, welche die kristalline Form C und/oder die kristalline Form D von Entacapone und einen therapeutisch inerten Träger enthalten.

Zweckmässigerweise enthalten diese Arzneimittel zusätzlich Levodopa und einen Decarboxylasehemmer, wie z.B. Carbidopa.

Da verschiedene kristalline Formen eines pharmazeutischen Wirkstoffes in der Regel verschiedene Bioverfügbarkeiten, 10 Löslichkeiten und Lösungsgeschwindigkeiten aufweisen, erweitern die neuen kristallinen Formen C und D von Entacapone die Möglichkeiten der medikamentösen Behandlung der Patienten. So kann es für den Patienten von grossem Nutzen sein, wenn z. B. aufgrund der Eigenschaften dieser 15 neuen kristallinen Formen die Bioverfügbarkeit von Entacapone erhöht wird (die Bioverfügbarkeit des handelsüblichen Entacapones beträgt nur 35%) und somit die Dosis verkleinert werden kann oder die Dosisintervalle vergrössert werden können. Dies würde nicht nur die 20 unerwünschten Nebenwirkungen von Entacapone reduzieren, die insbesondere bei höherer Dosierung häufiger auftreten als bei niedriger, sondern darüber hinaus auch eine Senkung der Medikamentenkosten bedeuten.

25

30

35

Erfindungsgemäss können die kristallinen Formen C und/oder D von Entacapone, gegebenenfalls in Kombination mit Levodopa und einem Decarboxylasehemmer, wie Carbidopa, bei der Behandlung des Parkinson-Syndroms bzw. zur Herstellung entsprechender Arzneimittel verwendet werden.

Die kristalline Form C von Entacapone kann erfindungsgemäss dadurch hergestellt werden, dass man Entacapone aus einem Gemisch von mindestens einem aromatischen und mindestens einem aliphatischen Kohlenwasserstoff kristallisiert. Dabei verwendet man als aromatischen Kohlenwasserstoff vorzugsweise Toluol und als aliphatischen Kohlenwasserstoff vorzugsweise n-Heptan. Andere hierfür geeignete aromatische

- 5 -

und aliphatische Kohlenwasserstoffe sind Benzol und alkylsubstituierte Derivate, z. B. p-Xylol, o-Xylol, Ethylbenzol und dergleichen bzw. n-Pentan, n-Hexan, Petrolether und dergleichen. Die Temperatur hängt natürlich zu einem gewissen Grad von den verwendeten Kohlenwasserstoffen ab; im Allgemeinen liegt sie zweckmässigerweise in einem Bereich von etwa Raumtemperatur bis etwa 100°C.

- 10 Beispielsweise kann man so vorgehen, dass man Entacapone unter Erhitzen in Toluol löst und die Lösung in auf etwa 95°C erhitztes n-Heptan gibt, wobei sofort eine Kristallisation eintritt. Dabei kann man rohes oder aufgereinigtes Entacapone einsetzen. Der kristallisierte 15 Feststoff der Form C von Entacapone kann durch Filtration bei etwa 90°C oder durch Filtration nach Abkühlen auf etwa Raumtemperatur und stehen lassen während mehrerer Stunden, beispielsweise während etwa 14 Stunden, gewonnen werden.
- 20 Die kristalline Form D von Entacapone kann erfindungsgemäss dadurch hergestellt werden, dass man Entacapone
  - a) in einem mit Wasser mischbaren Lösungsmittel löst und diese Lösung in Wasser oder ein gemischtwässriges System gibt, wobei sofort eine Kristallisation eintritt; oder

25

- b) in einem polaren aprotischen oder alkoholischen Lösungsmittel löst und diese Lösung zu einem mit diesem Lösungsmittel mischbaren aliphatischen Kohlenwasserstoff, in welchem Entacapone nicht löslich ist, gibt; oder
- 30 c) in einem nicht sauren Lösungsmittel oder einem Lösungsmittelgemisch mit mindestens einer nicht sauren Komponente in Gegenwart einer starken Säure kristallisiert.

Für die beiden Verfahrensvarianten a) und b) kann man rohes oder aufgereinigtes Entacapone einsetzen, nicht jedoch ein E/Z-Gemisch, wie es bei der Knoevenagel-Kondensation von 3,4-Dihydroxy-5-nitro-benzaldehyd und N,N-Diethyl-2-cyano-acetamid anfällt.

Für Verfahrensvariante c) kann man indessen durchaus das Produkt dieser Knoevenagel-Kondensation von 3,4-Dihydroxy-5-nitro-benzaldehyd und N,N-Diethyl-2-cyano-acetamid in situ einsetzen, als E/Z-Isomerengemisch, ohne dass dieses vorgängig isoliert und in seine Bestandteile aufgetrennt werden muss; bei der Behandlung mit einer starken Säure wandelt sich das im Isomerengemisch zu etwa 30% vorhandene Z-Isomere grösstenteils in das E-Isomere um, und das E-Isomere fällt vorwiegend in der polymorphen Form D an.

10

15

35

Als starke Säure für Verfahrensvariante c) verwendet man vorzugsweise Bromwasserstoff; andere hierfür geeignete Säuren sind Chlorwasserstoff, Iodwasserstoff, Schwefelsäure in Gegenwart von Alkalihalogeniden und dergleichen.

Zweckmässigerweise erfolgt die Kristallisation zu Form D gemäss Verfahrensvariante a) in einem Gemisch von Wasser und mindestens einem mit Wasser mischbaren organischen Lösungsmittel, vorzugsweise in THF/Wasser, Aceton/Wasser, 20 Aceton/DMSO/Wasser, n-Propanol/Wasser, gemäss Verfahrensvariante b) in einem Gemisch von einem polar aprotischen oder alkoholischen organischen Lösungsmittel und einem aliphatischen Kohlenwasserstoff, vorzugsweise THF/Hexan oder Isopropanol/Hexan, und gemäss 25 Verfahrensvariante c) durch Säurebehandlung in einem nicht sauren Lösungsmittel oder einem Gemisch organischer Lösungsmittel mit mindestens einer nicht sauren Komponente, vorzugsweise in Toluol/Acetonitril oder Toluol/Acetonitril/Essigsäure. 30

Verfahrensvariante c) ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung bevorzugt, und in einer besonders bevorzugten Ausführungsform dieser Verfahrensvariante c) verwendet man als starke Säure Bromwasserstoff und als Lösungsmittelgemisch Toluol/Acetonitril/Essigsäure.

- 7 -

Die Temperatur hängt natürlich zu einem gewissen Grad von der zur Anwendung gelangenden Verfahrensvariante und dem verwendeten Reaktionsmedium ab; im Allgemeinen liegt sie zweckmässigerweise in einem Bereich von etwa -10°C bis etwa 30°C, für das im Zusammenhang mit Verfahrensvariante b) erwähnte System Isopropanol/Hexan indessen in einem Bereich von etwa 0°C bis etwa 68°C.

5

25

30

35

Wie weiter oben erwähnt, kann man gemäss Verfahrensvariante c) für die Herstellung der polymorphen Form D von 10 Entacapone als Ausgangsmaterial das Produkt einer Knoevenagel-Kondensation von 3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehyd und N, N-Diethyl-2-cyano-acetamid in situ einsetzen. Diese Knoevenagel-Kondensation kann man erfindungsgemäss dadurch verbessern, dass man als 15 Katalysator Diethylamin/Essigsäure verwendet. Dies hat gegenüber dem in der Kondensation gemäss Stand der Technik verwendeten Katalysator Piperidin/Essigsäure den Vorteil, dass sich eine nur sehr schwierig zu entfernenden Verunreinigung, nämlich die dem Entacapone entsprechende 20 Verbindung, jedoch mit Piperidino- anstatt Diethylaminogruppe, nicht bilden kann.

Weiterhin kann man diese Knoevenagel-Kondensation erfindungsgemäss dadurch verbessern, dass man das eingesetzte N,N-Diethyl-2-cyano-acetamid durch Umsetzung von Cyanessigsäure mit Diethylamin in Gegenwart von Dicyclohexylcarbodiimid herstellt. Dies ist gegenüber herkömmlichen Verfahren zur Herstellung von N,N-Diethyl-2-cyano-acetamid insofern vorteilhaft, als niedrige Ausbeuten bzw. der Einsatz relativ teurer Chemikalien (wie 2-Chlor-N,N-diethylacetamid oder Butyllithium) bzw. in technischem Massstab nur mit Mühe realisierbare Bedingungen (wie -70°C) vermieden werden und dass das Produkt ohne vorhergehende Reinigung in die Knoevenagel-Kondensation eingesetzt werden kann, wodurch das Verfahren bei geringerem Energiebedarf (keine Notwendigkeit einer Hochvakuumdestillation) und

- 8 -

weniger Abfallprodukten wesentlich vereinfacht wird und hohe Ausbeuten liefert.

Schliesslich kann man die Knoevenagel-Kondensation erfindungsgemäss dadurch verbessern, dass man den eingesetzten 3,4-Dihydroxy-5-nitro-benzaldehyd durch Demethylierung von 5-Nitrovanillin mittels AlCl<sub>3</sub>/Pyridin in Chlorbenzol herstellt. Der so erhaltene 3,4-Dihydroxy-5-nitro-benzaldehyd fällt in hoher Ausbeute an, und seine gute Reinheit erlaubt es, dass er als Rohprodukt ohne vorangehende Reinigung in die Knoevenagel-Kondensation eingesetzt werden kann.

Die Knoevenagel-Kondensation kann zweckmässigerweise so durchgeführt werden, dass man 3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehyd, rohes N,N-Diethyl-2-cyanoacetamid, Essigsäure und Diethylamin in Toluol erhitzt, wobei das entstehende Wasser durch azeotrope Destillation mittels eines Wasserabscheiders entfernt wird.

20

25

30

35

5

10

15

Nach der Knoevenagel-Reaktion (Verhältnis E-/Z-Isomer = 70/30) kann man zweckmässigerweise wie folgt vorgehen: Das Reaktionsgemisch wird mit Acetonitril versetzt, um ölige Bestandteile zu lösen. Die erhaltene Lösung wird nach Behandlung mit Aktivkohle noch heiss in kaltes Toluol getropft, und anschliessend wird mit einer 33 %igen Lösung von HBr in Essigsäure versetzt. Dabei setzt langsam die Isomerisierung ein, wobei der Anteil des E-Isomers auf ≥ 90% ansteigt. Danach wird die erhaltene Suspension filtriert, und das Rohprodukt wird in einem Gemisch aus 2-Propanol und Wasser geschlämmt. Zur weiteren Reinigung wird das Rohprodukt unter Erwärmen in Aceton/Wasser (10/1) gelöst, und die Lösung wird in ein eiskaltes Gemisch aus Aceton und Wasser (5/95) getropft. Nach Schlämmung des Feuchtproduktes in Wasser erhält man das Entacapone in einer einheitlichen polymorphen Form und in einer HPLC-Reinheit von 99.7%.

# PCT/CH 03 / 00 8 5 3

- 9 -

Eine Untersuchung der polymorphen Formen während des Prozesses hat ergeben, das bereits nach der ersten Fällung aus kaltem Toluol die neue polymorphe Form D, ev. teilweise im Gemisch mit der neuen Form C, vorliegt. Daneben kann sich die Form D bei der Schlämmung aus 2-Propanol/Wasser in ein Gemisch der Formen C und D umwandeln. Bei der letzten Fällung von Entacapone aus Aceton und Wasser wird die nahezu reine polymorphe Form D erhalten. Die Ausbeute beträgt insgesamt >70%.

10

Die nachfolgenden Beispiele sollen die Erfindung näher erläutern, ihren Umfang jedoch in keiner Weise beschränken.

- 10 -

### Beispiel 1: Herstellung von 3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehyd

175.0 g 5-Nitro-vanillin und 135.1 g Aluminiumchlorid wurden in 774.2 g Chlorbenzol suspendiert. Es entstand eine orange-rote Suspension. Anschliessend wurden 319.9 g Pyridin derart zugetropft, dass die Innentemperatur 25°C nicht überstieg. Nach der Zugabe erhielt man eine tiefrote Suspension, die auf eine Innentemperatur von 70-80°C erhitzt wurde. Nach vollständigem Umsatz wurde das Reaktionsgemisch langsam mit einer Lösung aus 525 g Wasser 10 und 603.75 g 32%iger Salzsäure (halbkonzentrierte Salzsäure) versetzt. Während der Hydrolyse lag zunächst ein tiefrotes zweiphasiges Gemisch vor, aus dem gegen Ende der Hydrolyse ein gelber Feststoff ausfiel. Nach vollständiger Zugabe der halbkonzentrierten Salzsäure wurde die 15 Suspension im Vakuum auf die Hälfte aufkonzentriert. Anschliessend wurde die Suspension mit 475 g Wasser versetzt und zum Sieden erhitzt. Dabei löste sich der Feststoff. Nach 5-10 min unter Rückfluss liess man die Lösung langsam abkühlen, worauf ein Feststoff ausfiel. Die 20 Suspension wurde auf 20-25°C gekühlt, bei dieser Temperatur gerührt und anschliessend abgesaugt. Der Feststoff wurde mit 1000 g Wasser gewaschen und bei 60°C im Vakuum getrocknet (Ausbeute: 152.47 g).

25

30

35

Beispiel 2: Herstellung von N,N-Diethyl-2-cyano-acetamid 25.0 g Cyanessigsäure wurden in 163.08 g Ethylacetat gelöst. Zu der erhaltenen farblosen Lösung gab man langsam 21.70 g Diethylamin derart zu, dass die Innentemperatur 25°C nicht überstieg. Anschliessend wurde eine Lösung aus 61.10 g Dicyclohexylcarbodiimid in 54.06 g Ethylacetat zugetropft, wobei langsam ein Feststoff ausfiel. Nach der Zugabe wurde die Suspension über Nacht bei 35-40°C gerührt. Nach beendeter Reaktion wurde die Suspension auf 20-25°C gekühlt und abgesaugt. Den Feststoff wusch man mit 64.87 g Ethylacetat nach. Die vereinigten Filtrate wurden im Vakuum aufkonzentriert, wobei ein Feststoff ausfiel. Die Suspension nahm man in 45.05 g Ethylacetat auf, rührte bei

- 11 -

20-25°C, filtrierte den Feststoff ab und wusch mit 45.05 g Ethylacetat nach. Die vereinigten Filtrate wurden erneut im Vakuum eingeengt. Den Rückstand nahm man in 18.02 g Ethylacetat auf, filtrierte, wusch mit 13.52 g Ethylacetat nach und engte das Filtrat im Vakuum ein. Das so erhaltene Rohprodukt wurde anschliessend im Vakuum destilliert (Dampftemperatur 107-110°C, Druck 4x10<sup>-3</sup>-2x10<sup>-2</sup> Torr). Man erhielt in der Hauptfraktion 39.25 g (89%) 2-Cyanoessigsäurediethylamid.

10

35

# Beispiel 3: Herstellung von Entacapone in der polymorphen Form D

## 3.1. Knoevenagel-Kondensation und anschliessende

15 <u>Isomerisierung</u>

Ein Gemisch aus 120 g 3,4-Dihydroxy-5-nitro-benzaldehyd, 94.56 g N, N-Diethyl-2-cyano-acetamid, 3.76 g Essigsäure und 4.58 g Diethylamin in 432 g Toluol wurden am Wasserabscheider erhitzt. Nach nahezu vollständigem Umsatz (E/Z-Isomerenverhältnis = 70/30) gab man 109 g Acetonitril 20 und 38.4 g Aktivkohle zu und erhitzte 0.5-4 h unter Rückfluss. Die Suspension filtrierte man noch heiss über 14.0 g Celite und wusch anschliessend den Feststoff mit 66.1 g Acetonitril nach. Die Lösung wurde in eine Vorlage mit 432 g Toluol gegeben. Die Temperatur sollte dabei 20°C nicht übersteigen. Nach vollständiger Zugabe gab man 43.2 g einer 33 %igen HBr-Lösung in Essigsäure zu und liess das Gemisch über Nacht bei Raumtemperatur rühren. Anschliessend wurde die Suspension auf 0-5°C gekühlt und abgesaugt. Das feuchte Rohprodukt wurde in einem Gemisch aus 67.2 g 30 Isopropanol und 100.8 g Wasser geschlämmt und mit 200 g Wasser gewaschen. Die Ausbeute betrug 143.21 g (73.8% gehaltskorrigiert).

## 3.2. Herstellung des Entacapone in der polymorphen Form D

<u>Vorschrift 1:</u> 131.72 g des unter 3.1. erhaltenen Produktes wurden in 381.8 g Aceton und 38.2 g Wasser unter Erhitzen

- 12 -

auf 58°C gelöst. Diese Lösung gab man noch heiss zu einer kalten (0°C) Mischung aus 1211.2 g Wasser und 37.5 g Aceton sowie 0.3 g Entacapone (polymorphe Form D) derart zu, dass die Innentemperatur bei 0-12°C gehalten wurde.

Anschliessend wurde die Suspension abgesaugt und das Produkt in 1300 g Wasser 5-10 min bei 0°C geschlämmt. Es wurde erneut filtriert und das Produkt mit 130 g Wasser gewaschen. Die Ausbeute betrug 126.45 g (95.9% gehaltskorrigiert).

10

15

20

25

30

Vorschrift 2: 5.00 g des unter 3.1. erhaltenen Produktes wurden in 14.3 g THF in einem Rundkolben bei Siedetemperatur gelöst. Diese Lösung wurde noch heiss, bei einer Temperatur knapp unter dem Siedepunkt, in 124 g Eiswasser gegossen, danach wurde der Rundkolben mit 4.0 g THF nachgespült und diese Lösung ebenfalls zum Eiswasser gegeben. Die Suspension wurde bei einer Innentemperatur von 10°C abfiltriert, der Filterkuchen mit 15 g Eiswasser gewaschen und 15 h bei 50°C getrocknet. Die Ausbeute betrug 4.93 g (97.7% gehaltskorrigiert).

Vorschrift 3: 5.00 g des unter 3.1. erhaltenen Produktes wurden in 16.7 g THF in einem Rundkolben bei Siedetemperatur gelöst. Diese Lösung wurde noch heiss, bei einer Temperatur knapp unter dem Siedepunkt, in 86.4 g n-Hexan (Innentemperatur 3°C) gegossen, danach wurde der Rundkolben mit 4.1 g THF nachgespült und diese Lösung ebenfalls zur n-Hexan-Suspension gegeben. Die Suspension wurde bei einer Innentemperatur von 10°C abfiltriert und das Rohprodukt bei 50°C getrocknet. Die Ausbeute betrug 4.89 g (97.3% gehaltskorrigiert).

Vorschrift 4: 5.00 g des unter 3.1. erhaltenen Produktes wurden in 41.4 g Isopropanol bei Siedetemperatur gelöst. Diese Lösung wurde auf 68°C abgekühlt und in 126.0 g n-Hexan (Innentemperatur 68°C) gegossen. Die Suspension wurde sofort abfiltriert und der Filterkuchen 20 h bei 50°C

- 13 -

getrocknet. Die Ausbeute betrug 4.08 g (83.2% gehaltskorrigiert).

Vorschrift 5: 5.00 g des unter 3.1. erhaltenen Produktes wurden in 12.0 g n-Propanol bei Siedetemperatur gelöst. Diese Lösung wurde noch heiss, bei einer Temperatur knapp unter dem Siedepunkt, in 40.0 g Eiswasser gegossen. Die Suspension wurde bei einer Innentemperatur von 23°C abfiltriert, der Filterkuchen mit 10 g Eiswasser gewaschen und 15 h bei 70°C getrocknet. Die Ausbeute betrug 4.64 g (93.1% gehaltskorrigiert).

# Beispiel 4: Herstellung von Entacapone in der polymorphen Form C

15

20

10

5.00 g Entacapone wurden in 189.3 g Toluol unter Erhitzen gelöst und bei 95°C in 267 g heisses n-Heptan gegeben. Dabei setzte sofort eine Kristallisation ein. Die Hälfte der Suspension wurde bei 90°C heiss filtriert. Man erhielt 2.23 g Entacapone in der polymorphen Form C. Die zweite Hälfte der Suspension wurde auf Raumtemperatur gekühlt und nach 14 h abfiltriert. Man erhielt 2.57 g Entacapone, ebenfalls in der polymorphen Form C.

#### <u>Patentansprüche</u>

1. Kristalline Form C von Entacapone, charakterisiert durch die folgenden XRD-Daten:

Winkel 2 theta(°)	Gitterabstand d (Å)	rel. Intensität I/Imax(%)
5.61	15.77	100
11.43	7.78	1
14.75	6.06	2
17.23	5.21	5
18.81	4.78	2
20.89	4.32	. 1
23.13	3.92	17
25.23	3.62	2
26.87	3.41	3
29.03	3.18	1
32.17	2.90	2

2. Kristalline Form D von Entacapone, 10 charakterisiert durch die folgenden XRD-Daten:

Winkel 2 theta(°)	Gitterabstand d (Å)	rel. Intensität I/Imax(%)
6.84	12.95	99
11.84	7.51	6
12.12	7.34	7
13.52	6.59	49
14.8	6.04	23
15.56	5.75	40
16.54	5.42	31
16.9	5.30	22
17.98	4.99	37
18.84	4.77	12
19.06	4.72	13
20.72	4.36	18
21.44	4.22	28
22.24	4.07	12
23.4	3.88	22
24	3.79	39
24.62	3.70	76
25.34	3.60	51
26.5	3.46	65
27.44	3.35	100
28.08	3.28	51
29.24	3.16	15
29.98	3.09	17

- 3. Verfahren zur Herstellung der kristallinen Form C von Entacapone gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man Entacapone aus einem Gemisch von mindestens einem aromatischen und mindestens einem aliphatischen Kohlenwasserstoff kristallisiert.
- 4. Verfahren gemäss Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass man als aromatischen Kohlenwasserstoff Toluol und als aliphatischen Kohlenwasserstoff n-Heptan verwendet.
- 5. Verfahren zur Herstellung der kristallinen Form D von Entacapone gemäss Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass man Entacapone
  - a) in einem mit Wasser mischbaren Lösungsmittel löst und diese Lösung in Wasser oder ein gemischtwässriges System gibt; oder

- 16 -

- b) in einem polaren aprotischen oder alkoholischen Lösungsmittel löst und diese Lösung zu einem mit diesem Lösungsmittel mischbaren aliphatischen Kohlenwasserstoff, in welchem Entacapone nicht löslich ist, gibt; oder
- c) in einem nicht sauren Lösungsmittel oder einem Lösungsmittelgemisch mit mindestens einer nicht sauren Komponente in Gegenwart einer starken Säure kristallisiert.
- 6. Verfahren gemäss Anspruch 5, Variante a),
  10 dadurch gekennzeichnet, dass man in THF/Wasser,
  Aceton/Wasser, Aceton/DMSO/Wasser oder n-Propanol/Wasser
  arbeitet.
- 7. Verfahren gemäss Anspruch 5, Variante b), 15 dadurch gekennzeichnet, dass man in THF/Hexan oder Isopropanol/Hexan arbeitet.
- 8. Verfahren gemäss Anspruch 5, Variante c), dadurch gekennzeichnet, dass man in Toluol/Acetonitril oder 20 Toluol/Acetonitril/Essigsäure arbeitet.
  - 9. Verfahren gemäss Anspruch 5, Variante c), oder Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass man als Säure Bromwasserstoff verwendet.

10. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 5-9, dadurch gekennzeichnet, dass man rohes Entacapone einsetzt.

- 11. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 5,
  30 Variante c), 8 und 9, dadurch gekennzeichnet, dass man
  Entacapone in Form des Produkts einer KnoevenagelKondensation von 3,4-Dihydroxy-5-nitro-benzaldehyd und 2Cyano-essigsäurediethylamid in situ einsetzt.
- 12. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 5, Variante c), und 8-11, dadurch gekennzeichnet, dass man als Säure Bromwasserstoff verwendet und in Toluol/Acetonitril/Essigsäure arbeitet.

25

- 13. Kristalline Form C oder D von Entacapone gemäss Anspruch 1 oder 2 zur Anwendung als therapeutischer Wirkstoff.
- 14. Arzneimittel, enthaltend die kristalline Form C oder D von Entacapone gemäss Anspruch 1 oder 2 und einen therapeutisch inerten Träger.
- 15. Arzneimittel gemäss Anspruch 14, enthaltend zusätzlich Levodopa und einen Decarboxylasehemmer.

15

- 16. Verwendung der kristallinen Form C oder D von Entacapone gemäss Anspruch 1 oder 2, gegebenenfalls in Kombination mit Levodopa und einem Decarboxylasehemmer, bei der Behandlung des Parkinson-Syndroms bzw. zur Herstellung entsprechender Arzneimittel.
- 17. Verfahren zur Herstellung von Entacapone durch

  Knoevenagel-Kondensation von 3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehyd und N,N-Diethyl-2-cyano-acetamid, dadurch
  gekennzeichnet, dass man als Katalysator für diese
  Kondensation Diethylamin/Essigsäure verwendet.
- 18. Verfahren gemäss Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass man N,N-Diethyl-2-cyano-acetamid einsetzt, welches durch Umsetzung von Cyanessigsäure mit Diethylamin in Gegenwart von Dicyclohexylcarbodiimid hergestellt wurde.
  - 19. Verfahren gemäss Anspruch 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass man 3,4-Dihydroxy-5-nitro-benzaldehyd einsetzt, welcher durch Demethylierung von 5-Nitrovanillin mittels AlCl<sub>3</sub>/Pyridin in Chlorbenzol hergestellt wurde.

#### Zusammenfassung

20

Beschrieben werden zwei neue kristalline Formen von Entacapone, Form C und Form D. Diese stellen periphere und selektive COMT-Inhibitoren dar, welche, in Kombination mit Levodopa und einem Decarboxylasehemmer, zur Behandlung des Parkinson-Syndroms verwendet werden können.

10 Form C entsteht durch Kristallisation von Entacapone aus einem Gemisch von mindestens einem aromatischen und mindestens einem aliphatischen Kohlenwasserstoff.

Form D entsteht, wenn man Entacapone

- 15 a) in einem mit Wasser mischbaren Lösungsmittel löst und diese Lösung in Wasser oder ein gemischtwässriges System gibt; oder
  - b) in einem polaren aprotischen oder alkoholischen Lösungsmittel löst und diese Lösung zu einem mit diesem Lösungsmittel mischbaren aliphatischen Kohlenwasserstoff, in welchem Entacapone nicht löslich ist, gibt; oder
  - c) in einem nicht sauren Lösungsmittel oder einem Lösungsmittelgemisch mit mindestens einer nicht sauren Komponente in Gegenwart einer starken Säure kristallisiert.
- Dabei kann das Entacapone als Rohprodukt eingesetzt werden, in Variante c) auch als Produkt einer Knoevenagel-Kondensation von 3,4-Dihydroxy-5-nitro-benzaldehyd und N,N-Diethyl-2-cyano-acetamid, welches in situ einsetzt wird.
- Beschrieben werden weiterhin Verbesserungen dieser Knoevanagel-Kondensation, und zwar bezüglich des verwendeten Katalysators und bezüglich der Herstellung ihrer beiden Komponenten 3,4-Dihydroxy-5-nitro-benzaldehyd und N,N-Diethyl-2-cyano-acetamid.

			- <u>-</u>
	· Å		
			*